

## MADUREL®

## مادورل

**مادورل** در طول دوره رسیدن میوه در درختان میوه و سبزی و صیفی جات استفاده می شود. فرمول پیشرفته مادورل موجب تسریع رنگ پذیری، افزایش وزن، قند، اندازه و بازارپسندی محصول در زمان بلوغ می گردد. مادورل مشکل رنگ آوری در درختان میوه و محصولاتی که دارای رنگیزه ی قرمز می باشند مثل: انگور، هلو، سیب قرمز، گوجه فرنگی و گیلاس را مرتفع می کند و همچنین موجب کاهش استرس های محیطی می شود.

### محتوای تضمین شده

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| پتاسیم ( $K_2O$ ) قابل حل در آب | ۲۰ درصد |
| پرولین                          | ۲ درصد  |
| کربوکسیلیک اسید ها              | ۳۰ درصد |

### میزان و روش مصرف

- محصولات باغی (درختان هسته دار، دانه دار و انگور):  
۲ الی ۳ نوبت به فاصله ۱۵،۳۰،۴۵ روز قبل از برداشت به میزان ۲/۵ در هزار
- سبزی و صیفی (گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه و طالبی):  
۲ الی ۳ نوبت به فاصله ۱۵،۳۰،۴۵ روز قبل از برداشت به میزان ۲ لیتر در هکتار

